INFO-prairies Cantal

Bulletin n° 1
Le 04 mars 2013

Cumuls des températures en degrés au **3 mars 2013**
(cumuls calculés à partir du **1er FEVRIER, BASE 0 – 18 °C** , à partir des températures moyennes journalières - Source : Météo-France - Traitement CA15)

Plaine (300 à 500 m)	°C	Moyenne montagne (500 à 850 m)	°C	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	°C	Montagne (> 1100 m)	°C
FAYCELLES-46 (342 m)	**128**	AURILLAC (639 m)	**63**	COLTINES (979 m)	**15**	LAVEISSIERE (1238 m)	**7**
BRIOUDE-43 (435 m)	**69**	MAURIAC (674 m)	**54**	MARCENAT (1075 m)	**9**	ANZAT LE LUGUET (1270 m) (PUY DE DOME)	**8**
MAURS (480 m)	**108**	ST-PONCY (805 m)	**28**	DEUX VERGES (1080 m)	**15**		
COMIAC-46 (562 m)	**88**						
Gain moyen depuis le 24 février 2013	**23**	Gain moyen depuis le 24 février 2013	**13**	Gain moyen depuis le 24 février 2013	**4**	Gain moyen depuis le 24 février 2013	**4**

Conseils de la semaine

Commencer les apports d'azote en plaine.

Pour les communes les plus basses (< 400 m), compte tenu des précipitations et températures relativement douces annoncées pour cette fin de semaine, les 1ers apports d'N peuvent commencer sur les prairies les plus précoces et les plus productives qui seront utilisées en ensilage ou enrubannage. Cet apport azoté doit prendre en compte la fertilisation organique passée mais également le type de flore : 60 à 80 kg d'azote minéral/ha s'il n'y a pas eu d'apport organique, 40 à 60 avec un apport organique et/ou dans le cas d'associations (graminées et légumineuses) . Enfin, pour les prairies pâturées, limiter l'apport à 30 kg d'N/ha.

Epoque d'apport d'azote précoce pour une utilisation précoce de la prairie :

Altitudes	≤ 300 m	400 m – 500 m	600 m – 700 m
Périodes apport d'N sur prairie	25/02 – 10 /03	01/03 – 15/03	10/03 – 20/03

En moyenne montagne et montagne, si les conditions le permettent, terminer d'épandre fumier et lisier

Cumuls des températures / mode d'emploi :
A chaque stade de la prairie correspond une somme de température calculée à partir du 1er février.
Exemple : **pour les espèces précoces et de milieux fertiles ou assez fertiles** (RGA sauvage, dactyle et fétuque élevée, vulpin, houlque laineuse) : **démarrage de la végétation vers 200 - 250°C**, **prévoir** la **mise à l'herbe vers 250 - 300 °C** , **déprimage à faire avant 500 °C**. Prairies sur milieu peu fertiles (Agrostis, Fétuque rouge, pâturin commun) : démarrage de la végétation vers 300°C-400°C, déprimage possible jusqu'à 800 °C.
L'INFO-prairies permet de connaître chaque semaine l'état des sommes de température par poste météo et par zone d'altitude.

Bulletin réalisé par les conseillers de la Chambre d'Agriculture du CANTAL dans le cadre du programme régional -PRDA « Autonomie Fourragère » - et le soutien financier du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche - CasDAR

Renseignements : Christophe CHABALIER – 04 71 45 55 56

Bulletin consultable sur le site www.cantal.chambagri.fr